

**RECOLECCIÓN DE ORINA DE 24HS PARA DETERMINACION DE ÁCIDO  
VAINILLIN MANDELICO-METANEFRINAS FRACCIONADAS – ÁCIDO  
HOMOVANILICO- 3 METOXITIRAMINA.**

**Dieta:**

Durante 2 días no ingerir bananas, tomates, paltas, berenjenas, ananás, ciruelas, maníes, nueces, vainillas, postres, dulces y golosinas que contengan vainillina, té, chocolates, gaseosas, café, ni mate.

**Recipiente:**

Bidón con ácido clorhídrico provisto por el laboratorio.

**Recolección:**

- Al tercer día y manteniendo la dieta, recolectar orina de 24 horas.
- A las 7:00 horas, vaciar la vejiga orinando en el inodoro.
- A partir de ese momento, recoger la TOTALIDAD de la orina de todas las micciones en el bidón o en otro recipiente y luego trasvasar, hasta las 7:00 horas del día siguiente, también incluida.
- En los intervalos mantener el bidón en un lugar bien fresco o mejor, en heladera.
- Se recomienda no recolectar muestras de orina durante el período menstrual. En caso contrario junte cada muestra higienizándose previamente y colocándose un tampón vaginal.

IP-ADM-5  
Rev. 6