

ESPERMOCULTIVO - 1º CHORRO MICCIONAL

Régimen previo

- Abstinencia sexual de 2 a 5 días.
- Para el caso particular de espermocultivo estar sin tratamiento de antibióticos, por un lapso no menor de 5 días y tener retención de orina de 3 horas o más.
- Si recibió antibióticos recientemente, traer el nombre y la fecha en que finalizó el tratamiento.
- Si la indicación médica incluye cultivo de hisopado uretral o investigación de antígeno de *Clamydias trachomatis*, consultar por otras indicaciones.

Recolección:

- (1) Lavar manos y genitales (pene con retracción de la piel - prepucio) con abundante agua y jabón.
- Orinar y recolectar los primeros 3 ml. de orina en el frasco estéril (1er. chorro miccional), terminar de orinar en el inodoro.
- Repetir la higiene como en el punto (1)
- Recoger inmediatamente, por masturbación, el volumen total de la eyaculación en el recipiente estéril entregado.

- Remitir al Laboratorio en un tiempo no mayor a 1 hora.
- Si transcurre un tiempo mayor a 1 hora deberá protegerse de temperaturas extremas durante el traslado (no menos de 20° ni más de 37° C).

IMPORTANTE: Si ocurriera pérdida de la muestra durante la recolección, informar al Laboratorio. Así mismo, informar sobre medicamentos ingeridos, procesos febriles, infecciosos o alérgicos en los últimos tres meses. Indicar actividad laboral y si es fumador.

IP-ADM-22

Rev. 2

