Recolección de orina de 24 hs con conservante para Ácido Vainillín Mandélico (AVM), Catecolaminas, Dopamina, Metanefrinas, Normetanefrinas, Serotonina, Acido 5 OH Indol Acético

TIPO DE MUESTRA: Orina

AYUNO: No

PREPARACIÓN PREVIA

- Debe solicitar al laboratorio un frasco con conservante para ser utilizado durante la recolección de la muestra. El frasco es de uso exclusivo para mezclar con la orina durante la recolección, no debe consumirse ni utilizarse para otro propósito.

RECOLECCION DE ORINA

1. Al despertarse el día de la recolección, orine y descarte esa muestra como lo hace habitualmente.

2. A partir de este momento, vuelque todo el conservante del frasco color caramelo dentro de un recipiente limpio, de volumen suficiente, que permita recolectar la cantidad de toda la orina producida durante todo el día y la noche hasta la primera orina del día siguiente que será incluida, completando así 24 horas de recolección.

3. En el caso de completar un primer recipiente y requerir un segundo para continuar la toma de muestra, volcar la mitad de la orina recogida en el segundo envase, y continuar la recolección en ambos. De este modo se asegura que la muestra recolectada cumpla con el contacto con el conservante previsto.

4. Remita el bidón con el volumen total de orina al laboratorio.

Ejemplo de recolección: Si usted comienza la recolección a las 7 horas de la mañana, descartará esa primera micción e incluirá orina de las 7 horas del día siguiente.

OBSERVACIÓN:

En los intervalos de recolección mantener el bidón en un lugar bien fresco o de ser posible en heladera.
Si la prescripción médica solicitara examen de orina completa, la primera orina del día siguiente (la que completa las 24 hs.) deberá ser colectada en un frasco aparte.